

## Uri oxal

### Doplňkové krmivo pro psy

Doplňěk stravy pro psy jako prevence před okyselováním moči a tím pro snížení tvorby oxalátových kamenů. Oxalátové kameny se na rozdíl od struvitových velice špatně rozpouštějí, proto je velmi důležitá prevence.

#### Složení:

**Citrát tridraselný** - patří mezi neúčinnější látky pro alkalizaci moči po perorálním podání. Může podporovat rozpouštění krystalů oxalátu vápenatého a působit proti jejich opětovnému vzniku.

**N-acetyl-glukosamin** může posílit výstelku stěny močového měchýře a snížit dráždivý účinek močových krystalů. Mléčné výrobky, bramborový škrob, stearát hořečnatý, banánový prášek,

**Doplňkové látky na kg:** Vitamín B6 (3a831) 13500 mg-snižuje vylučování kyseliny šťavelové. Vitamín D 0 %.

**Doplňkové látky na tabletu (1500 mg):** 600 mg citrátu draselného, 20 mg vitamínu B6 (pyridoxin), 225 mg glukosaminu (jako N-acetylglukosamin).

**Analytické složky:** Bílkoviny 9,7 %, Tuk 4,0 %, Hrubá vláknina 4,0 %, Anorganická hmota 16,4 %, Vápník 0,1 %, Fosfor 0,1 %, Sodík <0,1 %, Hořčík 0,1 %, Draslík 14,8 %, Chlorid <0,1 %, Síra 0,0 %, Hydroxyprolin 0 %.

**Klíčové nutriční vlastnosti:** Nízký obsah vápníku (0,1 %), nízký obsah vitamínu D (<10 IU/kg), látky alkalizující moč (citrát draselný, banánový prášek, bramborový škrob), Nadbytek kationtů SID: 4,0 mmol/g.

#### Dávkování:

malí psi 5-15 kg	1-2 tbl/den
střední psi 15-25 kg	2-4 tbl/den
velcí psi 25-50 kg	3-6 tbl/den

#### Pokyny pro podávání

Tablety podávejte přímo do tlamy, rozdělené do 2 dávek nebo smíchané s krmivem. Po prvním týdnu krmení je třeba změřit pH moči, aby se v případě potřeby upravilo dávkování. Délka krmení: až 6 měsíců. Přípravek podávejte výhradně po konzultaci s veterinárním lékařem

**Skladování:** Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Po použití ihned uzavřete obal. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

**Prodejní balení:** dóza 60 tbl